

СТАНОВИЩЕ

От доц. Кузман Гиров , началник на клиника по съдова хирургия и ангиология на ВМА-София

Относно: Ефективността от приемането на хранителна добавка „Сириус-Д“ при пациенти с хронична артериална недостатъчност.

През последната една година в клиниката по съдова хирургия и ангиология се започна прилагането на хранителната добавка „Сириус-Д“ при пациенти с периферни артериални заболявания. Хранителната добавка се даваше на пациентите амбулаторно след изписване от клиниката. Не се прилагаха други преорални съдоразширяващи медикаменти ,поради оплаквания на пациентите от храносмилателния тракт. Посочената хранителна добавка беше приложена при трима мъже и една жена. Всичките бяха с оклузии на бедрените и подбедрените артерии установени с ангиография. Пациентите бяха с клаудикацио интермитенс ,вариращо от 10-50 м., т.е. във втора Б степен по класификацията на Фонтен. Поради характера на оклузиите пациентите не бяха подходящи за оперативно лечение и трябваше да минат на медикаментозна терапия. Клинични прегледи се провеждаха на всеки три месеца, като се измерваше брахио-глезенния индекс. В края на първата година се установи, че клаудикационното разстояние при пациентите се е увеличило от два до три пъти в метри ,а брахио-глезенния индекс се е увеличил с 10%. Пациентите продължават да приемат хранителната добавка по тяхно желание. Самите те отчитат подобряване на състоянието си.

Въпреки че,нашите наблюдения не могат да се класифицират като клинично изпитание на лекарствен продукт, считам че ,хранителната добавка има добър ефект за подобряване на периферното артериално кръвообръщение. Според мен това се дължи на подобряване на развитието на колатералната мрежа и оттам подобрената реваскуларизация на тъканите.

Дата:

03.07.2012г.

Подпис:

ВМА-София
КСХА
Доц. К. Гиров
съдов хирург